

Life

TRIVET  
Tissue Regeneration

TRITON

KUALCOS  
LABORATORIOS

Providean  
VIRATEC®

Línea  
HomeoProconvet

ProConvét  
S.A.

# línea Animales de Compañía





Porque **paraSU BIENESTAR**  
también sabemos **lo que ellos necesitan !!!**


@proconvet\_sa proconvet

proconvet proconvet S.A


## ANTIMICROBIANOS

COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN	
 <p>Registro ICA: 10147-MV - 10404-MV- 10403-MV</p>	<p><b>Doxiciclina Kualcos®</b></p> <p><i>Doxiciclina Kualcos 50 mg/tableta</i>  <i>Doxiciclina Kualcos 100 mg/tableta</i>  <i>Doxiciclina Kualcos 200 mg/tableta</i></p>	<p>En perros y gatos como antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas sensibles a la doxiciclina.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>                      Administrar cada 12 horas a dosis de 5 mg/kg.                      Administrar cada 24 horas a dosis de 10 mg/kg.</p>	<p>Tabletas 50mg – 100mg – 200mg                      Caja x 100 tabletas</p>
 <p>Registro ICA: 10429-MV- 10575-MV</p>	<p><b>Enrofloxacină Kualcos®</b></p> <p><i>Enrofloxacină Kualcos 50 mg/tableta</i>  <i>Enrofloxacină Kualcos 200 mg/tableta</i></p>	<p>En perros y gatos para el tratamiento de infecciones asociadas a microorganismos sensibles a la Enrofloxacină.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>                      Administrar a una dosis de 5 mg/kg de peso cada 24 horas. La dosis se puede dividir y administrar cada 12 horas.</p>	<p>Tabletas 50mg – 200mg                      Caja x 100 tabletas</p>


## ANTIPARASITARIOS








COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN	
 <p>Registro ICA: 8376-MV</p>	<p><b>Pirapraz®</b></p> <p><i>Pamoato de Pirantel .....145 mg</i>  <i>Praziquantel ..... 25 mg</i>  <i>Excipientes c.s.p ..... 1mL</i></p>	<p>Desparasitante interno para perros y gatos.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>                      En la práctica 1 mL por cada 5 kg de peso por vía oral.</p>	<p>Jeringas 2 – 5 – 10mL                      Frasco x 100mL</p>

## ANTIINFLAMATORIOS




COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN	
 <p>Registro ICA: 8537-MV</p>	<p><b>Dexametasona Iny. Kualcos®</b></p> <p><i>Dexametasona .....4 mg</i>  <i>Excipientes c.s.p ..... 1mL</i></p>	<p>Corticoide con propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras y antialérgicas de rápida acción y efecto prolongado.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>                      Administra por vía SC- IM- IV - IART a dosis de:                      Perros: 0,0125 a 1,05 mg/kg                      Gatos: 0,025 a 0,050 mg/kg                      Equinos: 0,04 a 0,15 mg/kg</p>	<p>Frasco x 10 – 50mL</p>
 <p>Registro ICA: 8295-MV</p>	<p><b>MeloxiPROC® 0.5% Solución Inyectable</b></p> <p><i>Meloxicam ..... 5 mg</i>  <i>Excipientes c.s.p ..... 1mL</i></p>	<p>En perros y gatos como analgésico, antiinflamatorio en trastornos músculo esqueléticos agudos y crónicos. Reducción del dolor pre y pos operatorio ortopédico y de tejidos blandos.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>                      Perros: Por vía IV - SC - IM, una dosis única de 0,4 mL/10 kg de peso. Gatos: Aplicar por vía subcutánea, una dosis única de 0,6 mL/10 kg peso.</p>	<p>Frasco x 10 - 30 mL</p>
 <p>Registro ICA: 8294-MV</p>	<p><b>MeloxiPROC® 0.15% Suspensión Oral</b></p> <p><i>Meloxicam.....1.5 mg</i>  <i>Excipientes c.s.p ..... 1mL</i></p>	<p>En perros y gatos como analgésico, antiinflamatorio en trastornos músculo - esqueléticos agudos y crónicos. Reducción del dolor pre y posoperatorio ortopédico y de tejidos blandos.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>                      Perros: 2 gotas por 1 kg de peso, el primer día. A partir del segundo día, 1 gota por 1 kg de peso, cada 24 horas, durante 5 a 7 días. Gatos: 3 gotas por 1 kg de peso. A partir del segundo día, 1 gota por 1 kg de peso, cada 24 horas, durante 5 a 7 días.</p>	<p>Frasco x 10mL</p>

## BIOLÓGICOS





COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN	
 <p>Registro ICA: 8306-BV</p>	<p><b>Providéan Primotec AT®</b></p> <p><i>Virus de Parvovirus canino .... ≥ 10<sup>8</sup> DICT<sub>50%</sub></i></p>	<p>Vacuna líquida para inmunizar caninos con ALTO RIESGO de contagio por Parvovirus.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>                      Administrar en perros sanos a partir de la 6<sup>ta</sup> u 8<sup>va</sup> semana de edad 1 ml vía SC o IM.</p>	<p>Caja x 50 dosis</p>

 <p>Registro ICA: 10386-BV.</p>	<p><b>Viratec® DP Microdosis</b></p> <p>Cada dosis de 0.5 mL contiene:</p> <p>Virus de Parvovirus canino ..... <math>\geq 10^7</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Distemper canino ..... <math>\geq 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p>	<p>Vacuna líquida para inmunizar caninos con ALTÍSIMO RIESGO de contagio por Parvovirus y/o Moquillo canino.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b> Administrar en perros sanos a partir de la 4<sup>ta</sup> o 6<sup>ta</sup> semana de edad 0.5 ml vía SC o IM.</p>	<p>Caja x 25 dosis</p>
 <p>Registro ICA:10383-BV.</p>	<p><b>Providean Viratec® PC</b></p> <p>Virus de Parvovirus canino..... <math>\geq 10^{6.5}</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Coronavirus canino ..... <math>\geq 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p>	<p>Vacuna líquida para inmunizar caninos con ALTO RIESGO de contagio de infecciones mixtas por Parvovirus canino y Coronavirus canino.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b> Administrar en perros sanos a partir de la 6<sup>ta</sup> u 8<sup>va</sup> semana de edad 1 ml vía SC o IM.</p>	<p>Caja x 50 dosis</p>
 <p>Registro ICA: 8312-BV</p>	<p><b>Providean Viratec® 5</b></p> <p>Virus de Parvovirus canino ..... <math>\geq 10^{6.5}</math> DICT<sub>5%</sub></p> <p>Virus de Distemper canino ..... <math>\geq 10^4</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Adenovirus canino tipo 2 ..... <math>\geq 10^3</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Parainfluenza canina ..... <math>\geq 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p>	<p>Vacuna liofilizada para inmunizar caninos contra Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Enfermedades respiratorias por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b> Administrar en perros sanos a partir de la 6<sup>ta</sup> u 8<sup>va</sup> semana de edad 1 ml vía SC o IM.</p>	<p>Caja x 25 dosis</p>
 <p>Registro ICA: 8313-BV.</p>	<p><b>Providean Viratec® 6 CV</b></p> <p>Virus de Parvovirus canino ..... <math>\geq 10^{6.5}</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Distemper canino ..... <math>\geq 10^4</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Adenovirus canino tipo 2 ..... <math>\geq 10^3</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Parainfluenza canina ..... <math>\geq 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Coronavirus canino..... <math>&gt; 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p>	<p>Vacuna liofilizada para inmunizar caninos contra el Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Enfermedades respiratorias por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza, y Coronavirus canino.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b> Administrar en perros sanos a partir de la 6<sup>ta</sup> u 8<sup>va</sup> semana de edad 1 ml vía SC o IM.</p>	<p>Caja x 25 dosis</p>
 <p>Registro ICA: 10407-BV.</p>	<p><b>Providean Viratec® 9 (4L)</b></p> <p>Virus de Parvovirus canino..... <math>\geq 10^{6.5}</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Distemper canino ..... <math>\geq 10^4</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Adenovirus canino tipo 2 ..... <math>\geq 10^3</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Parainfluenza canina ..... <math>\geq 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p> <p>Leptospira interrogans serovar Canicola..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p> <p>Leptospira interrogans serovar Pomona..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p> <p>Leptospira kirschneri serovar Grippotyphosa ..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p>	<p>Vacuna liofilizada para inmunizar caninos contra Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis canina, Enfermedades respiratorias por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b> Administrar como vacuna quintuple en perros sanos a partir de la 10<sup>ma</sup> u 12<sup>va</sup> semana de edad 1 ml vía SC o IM.</p>	<p>Caja x 25 dosis</p>
 <p>Registro ICA: 8310-BV.</p>	<p><b>Providean Viratec® 10 CV-4L</b></p> <p>Virus de Parvovirus canino ..... <math>\geq 10^{6.5}</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Distemper canino ..... <math>\geq 10^4</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Adenovirus canino tipo 2 ..... <math>\geq 10^3</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Virus de Parainfluenza canina ..... <math>\geq 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Coronavirus canino inactivado..... <math>\geq 10^5</math> DICT<sub>50%</sub></p> <p>Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p> <p>Leptospira interrogans serovar Canicola..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p> <p>Leptospira interrogans serovar Pomona..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p> <p>Leptospira kirschneri serovar Grippotyphosa ..... <math>\geq 10^7</math> Bact/dosis</p>	<p>Vacuna liofilizada para inmunizar caninos contra Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Enfermedades respiratorias por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza, Coronavirus y Leptospirosis canina.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b> Administrar como vacuna quintuple en perros sanos a partir de la 10<sup>ma</sup> u 12<sup>va</sup> semana de edad 1 ml vía SC o IM.</p>	<p>Caja x 25 dosis</p>
 <p>Registro ICA: 8309-BV.</p>	<p><b>Providean BH-RAB®</b></p> <p>Virus Rábico inactivado cepa Pasteur ..... <math>\geq 1</math> U.I. (N.I.H.)/Dosis.</p>	<p>Vacuna líquida inactivada para la prevención de la rabia en perros y gatos. Fórmula ultrafiltrada e indolora.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b> En primovacunación administrar en perros sanos a partir de la semana 12<sup>va</sup> de edad 1 ml vía SC o IM y una dosis de refuerzo 15 a 21 días después de la primera dosis. Revacunación anual con una sola dosis.</p>	<p>Caja x 50 dosis</p>

## DERMATOLÓGICOS



COMPOSICIÓN		INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN
 Registro ICA: 9657-MV	<b>MiclorPROC®</b> Champú Medicado  Clorhexidina Digluconato..... 2 g Miconazol Nitrato..... 2 g Excipientes c.s.p ..... 100 mL	En perros, gatos y caballos para el tratamiento de la dermatitis seborreica asociada a infecciones por <i>Staphylococcus intermedius</i> , <i>Malassezia pachydermatis</i> y coadyuvante en el tratamiento de infecciones por <i>Microsporum canis</i> . <b>Posología y modo de uso :</b> Aplicar el shampoo para formar abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos y enjuagar con agua limpia. Frecuencia de uso según criterio del médico veterinario tratante.	Frasco x 125 – 250 – 500mL
 Registro ICA: 8889-MV	<b>PeroxyPROC®</b> Champú Medicado  Peróxido de Benzoilo 60%.....25 mg Excipientes c.s.p .....1 mL	En perros y gatos, en piodermatitis y síndrome seborreico oleoso. Coadyuvante en el tratamiento de piodermatitis profunda; forunculosis, celulitis, epidermodicosis. <b>Posología y modo de uso:</b> Aplicar el shampoo para formar abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos y enjuagar con agua limpia. Frecuencia de uso según criterio del médico veterinario tratante.	Frasco 125 – 250 – 500mL
 Registro ICA: 10583-MV	<b>Tritohexidin®</b> Shampoo Medicado  Digluconato de Clorhexidina ..... 2,5 g Excipientes c.s.p ..... 100 mL	En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, perros y gatos para la desinfección de heridas y campo quirúrgico. Tratamiento de piodermas bacterianos y fúngicos. <b>Posología y modo de uso:</b> Aplicar el shampoo para formar abundante espuma. Dejar actuar por 10 minutos y enjuagar con agua limpia. Frecuencia de uso según criterio del médico veterinario tratante.	Frasco x 250mL


## HOMEOPÁTICOS

COMPOSICIÓN		INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN
 Registro ICA: 9241-MV	<b>ArtriPET®</b> Tabletas Composición por cada tableta. Arnica montana D7 ..... 6 µl Acidum formicicum D10 ..... 2 µl Ferrum phosphoricum D7 ..... 8 mg Apis mellifica D8 ..... 4 µl Ferrum metallicum D13 ..... 2 mg Calendula officinalis D6 ..... 4 µl Coffea arabica D11 ..... 6 µl Atropa belladonna D9 ..... 4 µl	Coadyuvante en el tratamiento de daños articulares degenerativos, traumatismos que comprometan los tejidos duros con gran dolor e inflamación. <b>Posología y modo de uso :</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9470-MV	<b>DiuriPET®</b> Tabletas Composición por cada tableta. Taraxacum officinale D5 ..... 0.015 mL Equisetum arvense D5 ..... 0.015 mL Malva sylvestris D7 ..... 0.015 mL Vaccinium myrtillus D8 ..... 0.005 mL	Coadyuvante en el tratamiento de nefritis, nefrolitiasis, cistitis, cistopielitis, urolitiasis, edemas, vaginitis, vulvovaginitis, ascitis. Favorece la Diuresis. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9465-MV	<b>GastroPET®</b> Tabletas Composición por cada tableta. Foeniculum vulgare miller D5 ..... 0.01 mL Nux moschata D8 ..... 0.01 mL Carbo vegetabilis D5 ..... 30 mg Zingiber officinale D5 ..... 0.005 mL Calendula officinalis D5 ..... 0.025 mL	Coadyuvante en el tratamiento de lesiones a la mucosa gástrica e intestinal, desinflama y facilita los procesos de regeneración celular de los tejidos afectados. Gastritis aguda, úlcera gástrica, gastroduodenitis, flatulencia gástrica e intestinal, antiemético, disminuye los síntomas de la distención abdominal. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9798-MV	<b>GinkgoPET®</b> Tabletas Composición por cada tableta. Selenium D6 ..... 10 mg Zincum D6 ..... 5 mg Cinnamomun verum D8 ..... 0.01 mL Coffea arabica D8 ..... 0.008 mL Calendula officinalis D10 ..... 0.005 mL Turnera diffusa D10 ..... 0.01 mL Silybum marianum D7 ..... 0.005 mL Ginkgo biloba D7 ..... 0.007 mL Chamomilla recutita D9 ..... 0.005 mL	Coadyuvante en el tratamiento de procesos que generen alta producción de radicales libres, en afecciones neurológicas en las cuales se requiera un neuroprotector. Se debe usar como medicina preventiva en pacientes geriátricos por su desgaste orgánico, disminución en la función mitocondrial y predisposición a la presencia de tumores. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas


 Registro ICA: 9240-MV	<b>HemoPET®</b> <b>Tabletas</b> Composición por cada tableta. <i>Aurum metallicum D16</i> ..... 2 mg <i>Ferrum metallicum D9</i> ..... 6 mg <i>Ferrum phosphoricum D10</i> ..... 6 mg <i>Ferrum sulphuricum D8</i> ..... 6 mg <i>Cinchona officinalis D9</i> ..... 6 µL <i>Cuprum metallicum D6</i> ..... 6 mg	Coadyuvante en el tratamiento de aquellos procesos que produzcan disminución en los niveles normales de eritrocitos (anemia) y/o plaquetas (trombocitopenia). <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9239-MV	<b>HepatoPET®</b> <b>Tabletas</b> Composición por cada tableta. <i>Cynara scolymus D8</i> ..... 8 µL <i>Cinchona officinalis D8</i> ..... 10 µL <i>Calendula officinalis D6</i> ..... 10 µL	Coadyuvante en el tratamiento de las patologías que afectan el normal funcionamiento del hígado, estimulante del apetito en pacientes convalecientes. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9341-MV	<b>HomeoPROC® Allergic</b> <b>Tabletas</b> Composición por cada tableta. <i>Arnica montana D5</i> ..... 0.01 mL <i>Calendula officinalis D6</i> ..... 0.015 mL <i>Hamamelis virginiana D7</i> ..... 0.015 mL <i>Echinacea angustifolia D6</i> ..... 0.005 mL <i>Hypericum perforatum D5</i> ..... 0.01 mL <i>Apis mellifica D5</i> ..... 0.005 mL <i>Calcium carbonatum D8</i> ..... 0.015 g <i>Urtica dioica D6</i> ..... 0.02 mL	Coadyuvante en el tratamiento de patologías alérgicas. Útil para activar el drenaje y depuración de sustancias de reacción acumuladas en los tejidos, las cuales producen irritación e inflamación. Disminuye el prurito y la ansiedad propios de afecciones alérgicas y atópicas. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9238-MV	<b>InmunoPET®</b> <b>Tabletas</b> Composición por cada tableta. <i>Echinacea angustifolia D6</i> ..... 0.01 mL <i>Magnesia sulphurica D6</i> ..... 5mg <i>Allium cepa D8</i> ..... 0.02 mL <i>Apis mellifica D9</i> ..... 0.015 mL <i>Aurum metallicum D9</i> ..... 5 mg	Coadyuvante en el tratamiento de aquellos procesos patológicos en donde se ve comprometiendo el normal funcionamiento del sistema inmune, ya sea por depresión o por incremento desmedido de su función. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9237-MV	<b>NaturPROC®</b> <b>Gel Oral</b> Composición por cada 100mL. <i>Calendula officinalis</i> ..... 3 mL <i>Foeniculum vulgare miller</i> ..... 3 mL <i>Mentha piperita</i> ..... 3 mL <i>Chamomilla recutita</i> ..... 4 mL	En perros, gatos y caballos como coadyuvante en procesos relacionados con gingivitis y halitosis. En bovinos y caballos para casos de estomatitis. Para higiene oral después de procesos quirúrgicos dentales. <b>Posología y modo de uso:</b> Aplicar mínimo dos veces al día sobre las lesiones existentes o sobre las encías en caso de mal aliento, hasta que las lesiones desaparezcan o de acuerdo al criterio del médico veterinario.	Tubo x 60 mL
 Registro ICA: 9236-MV	<b>SedanPET®</b> <b>Tabletas</b> Composición por cada tableta. <i>Passiflora incarnata D9</i> ..... 40 µL <i>Valeria officinalis D6</i> ..... 40 µL <i>Chamomilla recutita D8</i> ..... 30 µL	Coadyuvante en problemas de comportamiento; en animales agresivos, hiperactivos, difíciles de manejar, fobias, hiperexcitación nerviosismo y en estados de epilepsia como tratamiento complementario. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas
 Registro ICA: 9799-MV	<b>TabdolPET®</b> <b>Tabletas</b> Composición por cada tableta. <i>Arnica montana D5</i> ..... 0.015 mL <i>Calendula officinalis D6</i> ..... 0.01 mL <i>Coffea arabiga D7</i> ..... 0.005 mL <i>Atropa belladonna D5</i> ..... 0.015 mL <i>Chamomilla recutita D8</i> ..... 0.005 mL	Coadyuvante en el manejo del dolor de tipo agudo o crónico, de origen visceral, muscular y articular. <b>Posología y modo de uso:</b> Animales menores de 15 kg, una tableta dos veces al día. Mayores de 15 kg, 2 tabletas dos veces al día vía oral.	Frasco x 30 tabletas

## OFTALMOLÓGICOS


COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN
 Registro ICA: 8510-MV	<b>Oftaproc®</b> <b>Colirio</b> Composición por cada 100mL. <i>Neomicina base (como sulfato)</i> .....350 mg <i>Polimixina B base (como sulfato)</i> ...650.000 U.I.	Para el tratamiento de conjuntivitis agudas de origen bacteriano. <b>Posología y modo de uso:</b> Caninos y Felinos, aplicar una o dos gotas, tópicamente en el saco o sacos conjuntivales de 4 a 6 veces al día.
 Registro ICA: 8508-MV	<b>Oftaproc® E</b> <b>Colirio</b> Composición por cada 100mL. <i>Dexametasona fosfato disódico</i> ..... 100 mg <i>Neomicina base (como sulfato)</i> ..... 350 mg <i>Polimixina B base (como sulfato)</i> ....650.000 U.I.	Para el tratamiento de conjuntivitis aguda de origen bacteriano o alérgico en general. <b>Posología y modo de uso:</b> Caninos y Felinos, aplicar una o dos gotas, tópicamente en el saco o sacos conjuntivales de 4 a 6 veces al día.

 <p>Registro ICA: 9689-MV</p>	<p><b>Oftaproc® M</b> Colirio</p> <p>Composición por cada 100mL.</p> <p>Moxifloxacina clorhidrato ..... 0,50 g          Condroitin sulfato sódico ..... 5 g          Polimixina B sulfato ..... 1.000.000 U.I.</p>	<p>Indicado en casos de: queratoconjuntivitis infecciosa, conjuntivitis infecciosa, queratitis ulcerativa asociada a queratopatía bullosa. El producto se indica como coadyuvante del tratamiento post quirúrgico correspondiente a erosiones corneales traumáticas.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>          Aplicar 2 a 3 gotas tópicamente en el fondo del saco conjuntival cada 6, 8 o 12 horas según la gravedad del caso durante 7 a 10 días.</p>	<p>Gotero x 10mL</p>
---	--	--	----------------------


## OTROS FARMACOLÓGICOS

COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN	
 <p>Registro ICA: 7589-MV</p>	<p><b>Adrenalina VET</b></p> <p>Epinefrina base ..... 1mg          Excipientes c.s.p ..... 1mL</p>	<p>En bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos, como simpaticomimético en shock anafiláctico, broncoespasmo, bradicardia y asistolia.</p> <p><b>Posología y modo de uso :</b>          Equinos y Bovinos 4-8 ml. Ovinos y Porcinos 1-3 ml, Perros y Gatos 0,1 a 0,5 ml – S.C - IM - IV diluido.</p>	<p>Frasco x 20 mL</p>
 <p>Registro ICA: 10702-MV</p>	<p><b>Mepromazin®</b> Levomepromazina Maleato</p> <p>Levomepromazina maleato..... 10 mg/ Tab          Levomepromazina maleato..... 25 mg / Tab</p>	<p>Estados y procesos fóbicos o ansiosos con signos de hiperestesia. Inmersión en un entorno poco habitual o estresante con la probabilidad de desencadenar ataques de pánico (maniobras, transporte, fobias a las tormentas y detonaciones).</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>          La dosis varía en función al efecto buscado según la indicación. A modo general, el rango propuesto de uso para este medicamento es de 10 a 50 mg/m<sup>2</sup> en caninos.</p>	<p>Tabletas 10mg caja x 10 tabletas          Tabletas 25 mg caja x 8 tabletas</p>

## SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS Y/O MINERALES

COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN	
 <p>Registro ICA: 8536-MV</p>	<p><b>Kualcovit® B Jarabe</b></p> <p>Vitamina B1 ..... 4 mg          Vitamina B2 ..... 8 mg          Vitamina B6 ..... 5 mg          Pantotenato de calcio ..... 6,6 mg          Nicotinamida ..... 50 mg          Biotina ..... 2 mg          Excipientes c.s.p ..... 100mL</p>	<p>Tratamiento y prevención de deficiencia de los factores fundamentales del complejo B. Como complemento nutricional en gestación, lactancia, crecimiento, senilidad y convalecencia. Útil en estados de astenia y anorexia como promotor del apetito.</p> <p><b>Posología y modo de uso:</b>          Vía oral 5 mL por cada 5 kg de peso del animal, una vez por día.</p>	<p>Frasco x 120 mL</p>

## DISPOSITIVO MÉDICO

COMPOSICIÓN	INDICACIÓN Y DOSIS	PRESENTACIÓN	
	<p><b>BH - Vet</b> Bone Healing</p> <p>Dispositivo médico fabricado con biocerámico de silicofosfatos de sodio calcio. 1 gr de BH-Vet equivale a 1 gr de silicofosfatos de sodio calcio.</p>	<p>Relleno óseo diseñado para estimular y auxiliar procesos fundamentales para la regeneración de hueso en caninos, felinos y equinos, como es la osteogénesis y angiogénesis, a través de sus propiedades bioactivas, osteoinductoras y osteoconductoras, que en contacto con el hueso promueve la secreción de colágeno y de factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y transformante b (TGF-b).</p> <p>Usar el producto necesario para rellenar la cavidad ósea.</p>	<p>Caja con un frasco de 2 gramos.</p>